

狂犬病衛教宣導

- 狂犬病由狂犬病病毒引起的一種急性病毒性腦脊髓炎，一旦發病後，致死率高達 100%，但如能在動物咬傷後，及時就醫，接受狂犬病暴露後預防接種，可以有效的降低發病的風險。

發病症狀：

狂犬病初期症狀包括發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛等，咬傷部位會出現異樣感的症狀，持續數天後，病患會出現興奮及恐懼的現象，然後發展到麻痺、吞嚥困難，咽喉部肌肉之痙攣，引起恐水之症狀（所以又稱為恐水症），隨後會發生精神錯亂及抽搐。

預防方法：

1. 不碰觸、逗弄野生動物。
2. 不撿拾生病的野生動物、屍體，請洽詢各地動物防疫機關。

一旦被動物咬傷時，請遵循 1 記、2 沖、3 送、4 觀：

1. 記：保持冷靜，牢記動物特徵。
2. 沖：用大量肥皂、清水沖洗 15 分鐘，並以優碘消毒傷口。
3. 送：儘速送醫評估是否要接種疫苗。
4. 觀：儘可能將咬人動物繫留觀察 10 天。若動物兇性大發，不要冒險捕捉。

- 若不慎被動物咬傷，本縣市可至南基醫院、南投署立醫院、竹山秀傳醫院就醫處理。



白腹心



石虎



暹羅鱷



黃晶狓



鱗甲



鱗齒

預防 狂犬病 多警覺 ▲ 多安心

認識狂犬病

- 傳染途徑：90%是經由動物咬傷所造成。已感染狂犬病的動物咬傷人，或濺泥土或液體進入傷口，破壞中樞神經系統
- 潛伏期：約1-3個月，也可短至1週至7年
- 症狀：初期症狀發熱、喉嚨癢等，隨後會有高熱症；數日後，病患會出現興奮、恐懼、麻痺、吞嚥困難、喉嚨部肌肉痙攣(恐水症)，最後會發生精神混亂及抽搐。

人用狂犬病疫苗接種對象

- 1 被咬傷後 預防接種，經醫師評估，符合建議接種者，一定打得到
需接種4劑疫苗，第0天、3天、7天、14天、21或28天。僅有傷口嚴重或大面積時，需由醫師評估增加使用免疫球蛋白1劑。
- 2 被咬傷前 預防接種
需接種2劑疫苗，第0天、7天、21或28天。依風險高低，由政府衛生局指定地點接種。
 - 1 第一線動物防疫人員及屠犬人員
 - 2 動物收容所相關業務人員
 - 3 屠宰廠屠工

提高警覺 預防狂犬病

- 如何預防被動物咬傷？
 - 1 不接近野生動物
 - 2 不接近生病的野生動物、異種、瀕絕種野生動物等，可查詢各地動物防疫機關或電洽0800-761-590
- 被動物咬傷，請依照「1記」、「2沖」、「3洗」、「4報」。



到那裡就醫？ 各縣市都有人用狂犬病疫苗儲備醫院 查詢醫院，請洽1922防疫專線

請先將咬傷動物咬傷的動物、血液及唾液等，進行病毒學檢驗。同時評估咬傷特性，與傷口嚴重性，若需要施打人用狂犬病疫苗，應儘快至指定醫院接受治療。